

「藥品給付規定」修訂對照表(草案)

(自 111 年 2 月 1 日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>藥品給付規定通則</p> <p>一、~十、(略)</p> <p><u>十一、給付規定中年齡用詞統一使用</u></p> <p>「以上」、「以下」、「未滿」文字，並以阿拉伯數字呈現，定義如下(111/2/1)：</p> <p>(一) ○歲以上(包含○歲當日)。</p> <p>(二) ○歲以下(包含○歲當日)。</p> <p>(三) ○歲至未滿○歲(未滿○歲係不包含○歲當日)。</p>	<p>藥品給付規定通則</p> <p>一、~十、(略)</p>
<p>1.1.5. 非類固醇抗發炎劑 (NSAIDs) 藥品，屬下列成分之口服製劑： celecoxib、nabumetone、meloxicam、etodolac、nimesulide (90/7/1、97/9/1)、etoricoxib (96/1/1、99/10/1)、含 naproxen 及 esomeprazole 複方製劑(101/10/1) (106/12/1)</p> <p>1. 本類製劑之使用需符合下列條件之一者(99/10/1)：</p> <p>(1) <u>60 歲以上</u>之骨關節炎病患。 (celecoxib 可用於 <u>50 歲以上</u>之骨關節炎病患) (106/12/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>(2)~(7)(略)。</p> <p>2. ~4. (略)。</p>	<p>1.1.5. 非類固醇抗發炎劑 (NSAIDs) 藥品，屬下列成分之口服製劑： celecoxib、nabumetone、meloxicam、etodolac、nimesulide (90/7/1、97/9/1)、etoricoxib (96/1/1、99/10/1)、含 naproxen 及 esomeprazole 複方製劑(101/10/1) (106/12/1)</p> <p>1. 本類製劑之使用需符合下列條件之一者(99/10/1)：</p> <p>(1) <u>年齡大於等於六十歲</u>之骨關節炎病患。(celecoxib 可用於<u>年齡大於等於五十歲</u>之骨關節炎病患) (106/12/1)</p> <p>(2)~(7)(略)。</p> <p>2. ~4. (略)。</p>
<p>1.1.9. Fentanyl citrate 口頰溶片或口頰錠(108/10/1)</p> <p>1. 限用於突發性疼痛(breakthrough pain)，並已接受過口服 morphine 至少 60mg/day、oxycodone 至少</p>	<p>1.1.9. Fentanyl citrate 口頰溶片或口頰錠(108/10/1)</p> <p>1. 限用於突發性疼痛(breakthrough pain)，並已接受過口服 morphine 至少 60mg/day、oxycodone 至少</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>30mg/day、hydromorphone 至少 8mg/day、或 fentanyl 貼片劑至少 25/mcg/hr 或其他等止痛劑量之類鴉片藥物達一星期(含)以上之 <u>18 歲以上</u> 癌症患者(<u>111/2/1</u>)。</p> <p>2. (略)。</p>	<p>30mg/day、hydromorphone 至少 8mg/day、或 fentanyl 貼片劑至少 25/mcg/hr 或其他等止痛劑量之類鴉片藥物達一星期(含)以上之 <u>18 歲(含)</u> 以上癌症患者。</p> <p>2. (略)。</p>
<p>1. 3. 2. 4. Levetiracetam (101/6/1、102/10/1、108/5/1)</p> <p>1. 一般錠劑膠囊劑 (如 Keppra Film-Coated Tablets) : (97/1/1、101/6/1)</p> <p>(1)限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療 (add on therapy) 或作為第二線之單一藥物治療。</p> <p>(2)<u>12 歲以上</u>病患之肌抽躍性癲癇發作之輔助治療(<u>111/2/1</u>)。</p> <p>2. 緩釋錠劑膠囊劑 : (101/6/1、108/5/1)</p> <p>限使用於 <u>16 歲以上</u>病患之局部癲癇發作之輔助治療(<u>111/2/1</u>)。</p> <p>3. ~4. (略)。</p>	<p>1. 3. 2. 4. Levetiracetam (101/6/1、102/10/1、108/5/1)</p> <p>1. 一般錠劑膠囊劑 (如 Keppra Film-Coated Tablets) : (97/1/1、101/6/1)</p> <p>(1)限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療 (add on therapy) 或作為第二線之單一藥物治療。</p> <p>(2)<u>十二歲以上青少年與成人</u>病患之肌抽躍性癲癇發作之輔助治療。</p> <p>2. 緩釋錠劑膠囊劑 : (101/6/1、108/5/1)</p> <p>限使用於 <u>十二歲以上</u>病患之局部癲癇發作之輔助治療。</p> <p>3. ~4. (略)。</p>
<p>1. 3. 2. 5. Lamotrigine (如 Lamictal) (97/10/1)</p> <p>限下列病患使用：</p> <p>1. 限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療 (add on therapy) 或作為第二線之單一藥物治療。</p> <p>2. 限使用於 18 歲以上且為雙極性疾患者，並依下列原則使用(<u>111/2/1</u>)：</p> <p>(1)~(3)(略)。</p>	<p>1. 3. 2. 5. Lamotrigine (如 Lamictal) (97/10/1)</p> <p>限下列病患使用：</p> <p>1. 限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療 (add on therapy) 或作為第二線之單一藥物治療。</p> <p>2. 限使用於 18 歲以上成人且為雙極性疾患者，並依下列原則使用：</p> <p>(1)~(3)(略)。</p>
<p>1. 3. 5. Methylphenidate HCl 緩釋劑型 (如 Concerta Extended Release Tablets、Methydur Sustained Release Capsules)；atomoxetine HCl</p>	<p>1. 3. 5. Methylphenidate HCl 緩釋劑型 (如 Concerta Extended Release Tablets、Methydur Sustained Release Capsules)；atomoxetine HCl</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>(如 Straterra Hard capsules) (93/9/1、96/5/1、96/9/1、97/5/1、106/3/1、109/9/1)</p> <p>1. 限 <u>6 歲以上至 18 歲以下</u>，依 DSM 或 ICD 標準診斷為注意力不全過動症患者，並於病歷上詳細記載其症狀、病程及診斷。(96/9/1、106/3/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>2. 如符合前項規定且已使用本類藥品治療半年以上，而 <u>18 歲以上</u>仍需服用者，需於病歷上詳細記載以往病史及使用理由。(96/9/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>3. (略)。</p>	<p>(如 Straterra Hard capsules) (93/9/1、96/5/1、96/9/1、97/5/1、106/3/1、109/9/1)</p> <p>1. 限六歲至十八歲(含)，依 DSM 或 ICD 標準診斷為注意力不全過動症患者，並於病歷上詳細記載其症狀、病程及診斷。(96/9/1、106/3/1)</p> <p>2. 如符合前項規定且已使用本類藥品治療半年以上，而十八歲後仍需服用者，需於病歷上詳細記載以往病史及使用理由。(96/9/1)</p> <p>3. (略)。</p>
<p>2. 1. 4. 1. Fondaparinux (如 Arixtra)： (100/4/1、100/7/1、103/2/1)</p> <p>限用於</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. 治療 <u>60 歲以上</u>患有不穩定型心絞痛或非 ST 段升高型心肌梗塞(UA/NSTEMI)且不適合接受緊急(120 分鐘內)侵入性治療(PCI)者，其症狀開始時間需在 24 小時之內，且血清肌酸酐需小於 3.0 mg/dL。(103/2/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>3. (略)。</p>	<p>2. 1. 4. 1. Fondaparinux (如 Arixtra)： (100/4/1、100/7/1、103/2/1)</p> <p>限用於</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. 治療年齡大於或等於 60 歲患有不穩定型心絞痛或非 ST 段升高型心肌梗塞(UA/NSTEMI)且不適合接受緊急(120 分鐘內)侵入性治療(PCI)者，其症狀開始時間需在 24 小時之內，且血清肌酸酐需小於 3.0 mg/dL。(103/2/1)</p> <p>3. (略)。</p>
<p>2. 1. 4. 2. Rivaroxaban(如 Xarelto) (101/1/1、102/2/1、103/5/1、104/12/1、105/5/1、110/7/1)</p> <p>限用於</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. 非瓣膜性心房纖維顫動病患，須符合下列條件之一：(102/2/1、103/5/1、105/5/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>(1)~(3)(略)。</p> <p>(4)<u>75 歲以上</u>。</p> <p>(5)<u>65 歲以上未滿 75 歲</u>且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。</p> <p>(6)~(7)(略)。</p>	<p>2. 1. 4. 2. Rivaroxaban(如 Xarelto) (101/1/1、102/2/1、103/5/1、104/12/1、105/5/1、110/7/1)</p> <p>限用於</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. 非瓣膜性心房纖維顫動病患，須符合下列條件之一：(102/2/1、103/5/1、105/5/1)</p> <p>(1)~(3)(略)。</p> <p>(4)<u>年齡 75 歲(含)以上</u>。</p> <p>(5)<u>年齡介於 65 歲至 74 歲</u>且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。</p> <p>(6)~(7)(略)。</p>

修訂後給付規定	原給付規定
3. (略)。	3. (略)。
2. 1. 4. 3. Apixaban (如 Eliquis) (103/6/1、106/4/1、 <u>111/2/1</u>) 限用於 1. 非瓣膜性心房纖維顫動病患： (1)須符合下列條件之一： I. ~III. (略)。 IV. <u>75 歲以上</u> 。 V. <u>65 歲以上未滿 75 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病</u> 。 (2)~(3)(略)。 2. (略)。	2. 1. 4. 3. Apixaban (如 Eliquis) (103/6/1、106/4/1) 限用於 1. 非瓣膜性心房纖維顫動病患： (1)須符合下列條件之一： I. ~III. (略)。 IV. <u>年齡 75 歲(含)以上</u> 。 V. <u>年齡介於 65 歲至 74 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病</u> 。 (2)~(3)(略)。 2. (略)。
2. 1. 4. 4. Edoxaban(如 Lixiana)： (105/9/1、 <u>111/2/1</u>) 限用於 1. 非瓣膜性心房纖維顫動病患： (1)須符合下列條件之一： I. ~III. (略)。 IV. <u>75 歲以上</u> 。 V. <u>65 歲以上未滿 75 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病</u> 。 (2)~(3)(略)。 2. (略)。	2. 1. 4. 4. Edoxaban(如 Lixiana)： (105/9/1) 限用於 1. 非瓣膜性心房纖維顫動病患： (1)須符合下列條件之一： I. ~III. (略)。 IV. <u>年齡 75 歲(含)以上</u> 。 V. <u>年齡介於 65 歲至 74 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病</u> 。 (2)~(3)(略)。 2. (略)。
2. 1. 5. 直接凝血酶抑制劑(Direct thrombin inhibitors)： Dabigatran(如 Pradaxa) (101/6/1、104/12/1、107/9/1) 1. 用於非瓣膜性心房纖維顫動病患： (1)須符合下列條件之一(<u>111/2/1</u>)： I. ~III. (略)。 IV. <u>75 歲以上</u> 。 V. <u>65 歲以上未滿 75 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病</u> 。 (2)~(3)(略)。 2. ~3. (略)。	2. 1. 5. 直接凝血酶抑制劑(Direct thrombin inhibitors)： Dabigatran(如 Pradaxa) (101/6/1、104/12/1、107/9/1) 1. 用於非瓣膜性心房纖維顫動病患： (1)須符合下列條件之一： I. ~III. (略)。 IV. <u>年齡 75 歲(含)以上</u> 。 V. <u>年齡介於 65 歲至 74 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病</u> 。 (2)~(3)(略)。 2. ~3. (略)。
2. 10. 1. Dronedarone (如 Multaq) (100/8/1)	2. 10. 1. Dronedarone (如 Multaq) (100/8/1)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>1. Multaq 適用於最近 6 個月內有陣發性或持續性心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL)，且目前處於竇性節律(sinus rhythm) 狀態或即將接受治療成為正常節律的患者，可降低病患發生心血管疾病而住院的風險(111/2/1)：</p> <p>(1) <u>70 歲以上</u>，曾有過心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL)之病患；</p> <p>(2) <u>65 歲以上未滿 70 歲</u>，且帶有下列心血管相關危險因子之一的患者(例如：高血壓、糖尿病、曾發生過腦血管意外、左心房直徑$\geq 50\text{mm}$或左心室射出率【LVEF】$<40\%$)。</p> <p>2. (略)。</p>	<p>1. Multaq 適用於最近 6 個月內有陣發性或持續性心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL)，且目前處於竇性節律(sinus rhythm) 狀態或即將接受治療成為正常節律的患者，可降低病患發生心血管疾病而住院的風險：</p> <p>(1) <u>年齡≥ 70 歲以上</u>，曾有過心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL)之病患；</p> <p>(2) <u>$65 \leq \text{年齡} < 70$ 歲</u>，且帶有下列心血管相關危險因子之一的患者(例如：高血壓、糖尿病、曾發生過腦血管意外、左心房直徑$\geq 50\text{mm}$或左心室射出率【LVEF】$<40\%$)。</p> <p>2. (略)。</p>
<p>2. 13. 2. Tolvaptan (如 Jinarc)(108/7/1、109/10/1)：</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. 初次使用限用於已出現病情迅速惡化跡象之第 3 期慢性腎臟病的 <u>18 歲以上</u>，<u>50 歲以下</u>自體顯性多囊性腎臟病(ADPKD) 患者，且腎臟影像呈雙側/瀰漫性水泡，病情須符合下列至少一項(109/10/1、111/2/1)：</p> <p>(1) 一年之內 eGFR 下降$\geq 5.0 \text{ mL/min}/1.73 \text{ m}^2$ 或五年內 eGFR 每年下降$\geq 2.5 \text{ mL/min}/1.73 \text{ m}^2$，且排除其它如脫水、藥物、感染、阻塞等原因所致。</p> <p>(2) htTKV 符合 Mayo 分期 1C-1E disease</p> <p>3. ~4. (略)。</p>	<p>2. 13. 2. Tolvaptan (如 Jinarc)(108/7/1、109/10/1)：</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. 初次使用限用於已出現病情迅速惡化跡象之第 3 期慢性腎臟病的 <u>18-50 歲</u>自體顯性多囊性腎臟病(ADPKD) 患者，且腎臟影像呈雙側/瀰漫性水泡，病情須符合下列至少一項(109/10/1)：</p> <p>(1) 一年之內 eGFR 下降$\geq 5.0 \text{ mL/min}/1.73 \text{ m}^2$ 或五年內 eGFR 每年下降$\geq 2.5 \text{ mL/min}/1.73 \text{ m}^2$，且排除其它如脫水、藥物、感染、阻塞等原因所致。</p> <p>(2) htTKV 符合 Mayo 分期 1C-1E disease</p> <p>3. ~4. (略)。</p>
<p>4. 2. 1. Human Albumin : (100/8/1)</p> <p>1. 本保險對象因病使用 Human Albumin 以符合下列適應症為限 (96/6/1、104/11/1、111/2/1)：</p> <p>(1) 休克病人擴充有效循環血液量 I (略)。</p> <p>II <u>70 歲以上及 2 歲以下或併有心衰竭的</u></p>	<p>4. 2. 1. Human Albumin : (100/8/1)</p> <p>1. 本保險對象因病使用 Human Albumin 以符合下列適應症為限 (96/6/1、104/11/1)：</p> <p>(1) 休克病人擴充有效循環血液量 I (略)。</p> <p>II <u>70 歲以上老人及二歲以下幼兒或併有</u></p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>休克病人，無法忍受太多靜脈輸液時，可一開始即使用白蛋白溶液，每一病人用量限 50 gm。</p> <p>(2)病危、有腹水或水腫併有血清白蛋白濃度偏低病人</p> <p>I 血清白蛋白濃度低於 2.5 gm/dL</p> <p>i. ~iv(略)。</p> <p>v. 蛋白質流失性腸症(protein-losing enteropathy) (104/11/1)</p> <p>依下列規範使用：</p> <p>(i)經內視鏡或手術或病理報告證實為蛋白質流失性腸症；或糞便 alpha-1-antitrypsin 升高。</p> <p>(ii)<u>18 歲以下</u>。</p> <p>II ~ III(略)。</p> <p>2. (略)。</p>	<p>心衰竭的休克病人，無法忍受太多靜脈輸液時，可一開始即使用白蛋白溶液，每一病人用量限 50 gm。</p> <p>(2)病危、有腹水或水腫併有血清白蛋白濃度偏低病人</p> <p>I 血清白蛋白濃度低於 2.5 gm/dL</p> <p>i. ~iv(略)。</p> <p>v. 蛋白質流失性腸症(protein-losing enteropathy) (104/11/1)</p> <p>依下列規範使用：</p> <p>(i)經內視鏡或手術或病理報告證實為蛋白質流失性腸症；或糞便 alpha-1-antitrypsin 升高。</p> <p>(ii)<u>滿 18 歲以內兒童</u>。</p> <p>II ~ III(略)。</p> <p>2. (略)。</p>
<p>4. 3. 2. 1. Eltrombopag (如 Revolade)(108/6/1、109/2/1)</p> <p>1. 限用於 <u>6 歲以上</u>之慢性自發性(免疫性)血小板缺乏紫斑症(ITP)且對於其他治療(例如：類固醇、免疫球蛋白等)失敗患者，且符合下列情況之一者使用： (105/8/1、106/4/1、108/6/1、109/2/1、<u>111/2/1</u>) (以下略)</p>	<p>4. 3. 2. 1. Eltrombopag (如 Revolade)(108/6/1、109/2/1)</p> <p>1. 限用於 <u>6 歲(含)</u>以上之慢性自發性(免疫性)血小板缺乏紫斑症(ITP)且對於其他治療(例如：類固醇、免疫球蛋白等)失敗患者，且符合下列情況之一者使用： (105/8/1、106/4/1、108/6/1、109/2/1) (以下略)</p>
<p>4. 3. 4. Icatibant (如 Firazyr)： (109/6/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. 限用於 <u>2 歲以上</u>之體內 C1 酯酶抑制劑不足之 HAE 患者於急性發作時進行症狀治療，並符合下列臨床標準： (以下略)</p>	<p>4. 3. 4. Icatibant (如 Firazyr)： (109/6/1)</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. 限用於 <u>2 歲(含)</u>以上之體內 C1 酯酶抑制劑不足之 HAE 患者於急性發作時進行症狀治療，並符合下列臨床標準： (以下略)</p>
<p>5. 4. 1. 1. 生長激素 (Somatropin)：</p> <p>1. ~3. (略)。</p> <p>4. 透納氏症候群病人使用生長激素治療的原則： (111/2/1)</p>	<p>5. 4. 1. 1. 生長激素 (Somatropin)：</p> <p>1. ~3. (略)。</p> <p>4. 透納氏症候群病人使用生長激素治療的原則：</p>

修訂後給付規定	原給付規定
(1)~(2)(略)。 (3)開始治療條件： I <u>6歲以上</u> 。 II 身高低於第三百分位以下且生長速率一年小於四公分，需具有資格申請生長激素治療的醫療機構身高檢查，每隔三個月一次，至少六個月以上之紀錄。(96/11/1) III 骨齡 <u>14歲以下</u> (請檢附骨齡X光片) (4)(略)。 (5)繼續治療條件 (每年評估一次)： I 骨齡 <u>14歲以下</u> 。 II. ~III. (略)。 5. 用於治療 SHOX 缺乏症患者使用生長激素治療的原則：(104/6/1、 <u>111/2/1</u>) (1)(略)。 (2)開始治療條件： I. 年齡 <u>6歲以上</u> 。 II. 身高低於第三百分位以下且生長速率一年小於四公分，需具有資格申請生長激素治療的醫療機構身高檢查，每隔三個月一次，至少六個月以上之紀錄。 III. 骨齡：男性 <u>16歲以下</u> 、女性 <u>14歲以下</u> (請檢附骨齡X光片) (3)(略)。 (4)繼續治療條件(每年評估一次)： I. 骨齡：男性 <u>16歲以下</u> 、女性 <u>14歲以下</u> (請檢附骨齡X光片) II. ~III. (略)。 (5)(略)。	(1)~(2)(略)。 (3)開始治療條件： I <u>年齡至少六歲</u> 。 II 身高低於第三百分位以下且生長速率一年小於四公分，需具有資格申請生長激素治療的醫療機構身高檢查，每隔三個月一次，至少六個月以上之紀錄。(96/11/1) III 骨齡 <u>≤14歲</u> (請檢附骨齡X光片) (4)(略)。 (5)繼續治療條件 (每年評估一次)： I 骨齡 <u>≤14歲</u> 。 II. ~III. (略)。 5. 用於治療 SHOX 缺乏症患者使用生長激素治療的原則：(104/6/1) (1)(略)。 (2)開始治療條件： I. 年齡 <u>至少六歲</u> 。 II. 身高低於第三百分位以下且生長速率一年小於四公分，需具有資格申請生長激素治療的醫療機構身高檢查，每隔三個月一次，至少六個月以上之紀錄。 III. 骨齡：男性 <u>≤16歲</u> 、女性 <u>≤14歲</u> (請檢附骨齡X光片) (3)(略)。 (4)繼續治療條件(每年評估一次)： I. 骨齡：男性 <u>≤16歲</u> 、女性 <u>≤14歲</u> (請檢附骨齡X光片) II. ~III. (略)。 (5)(略)。
5. 5. 1. Gn-RH analogue (如 Buserelin；Goserelin；Leuprorelin；Triptorelin；Nafarelin(acetate)等製劑) (92/1/1、93/4/1、95/4/1、98/5/1、99/2/1、99/10/1、100/2/1、	5. 5. 1. Gn-RH analogue (如 Buserelin；Goserelin；Leuprorelin；Triptorelin；Nafarelin(acetate)等製劑) (92/1/1、93/4/1、95/4/1、98/5/1、99/2/1、99/10/1、100/2/1、

修訂後給付規定	原給付規定
<p>106/2/1、109/2/1、110/12/1)</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. 本類製劑用於中樞性早熟、乳癌及子宮內膜異位症病例需經事前審查核准後依下列規範使用(98/5/1、99/10/1、<u>111/2/1</u>)：</p> <p>(1)中樞性早熟</p> <p>I. (略)</p> <p>II. 治療條件：</p> <p>i. 年齡：開始發育的年齡，女孩<u>7歲以下</u>，男孩<u>8歲以下</u>。</p> <p>ii. ~iv. (略)。</p> <p>III. ~IV. (略)。</p> <p>V. 繼續治療條件：</p> <p>i. 生長速率≥ 2公分／年，</p> <p>ii. 骨齡：女<u>14歲以下</u>，男<u>15歲以下</u>。</p> <p>VI. ~ VII. (略)。</p> <p>(2)~(4)(略)。</p>	<p>106/2/1、109/2/1)</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. 本類製劑用於中樞性早熟、乳癌及子宮內膜異位症病例需經事前審查核准後依下列規範使用(98/5/1、99/10/1)：</p> <p>(1)中樞性早熟</p> <p>I. (略)</p> <p>II. 治療條件：</p> <p>i. 年齡：開始發育的年齡，女孩<u>≤七歲</u>，男孩<u>≤八歲</u>。</p> <p>ii. ~iv. (略)。</p> <p>III. ~IV. (略)。</p> <p>V. 繼續治療條件：</p> <p>i. 生長速率≥ 2公分／年，</p> <p>ii. 骨齡：女<u>小於十四歲</u>，男<u>小於十五歲</u>。</p> <p>VI. ~ VII. (略)。</p> <p>(2)~(4)(略)。</p>
<p>5. 5. 7. Mecasermin (如 Increlex 注射劑) (98/5/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. Primary IGF-I deficiency</p> <p>(1)診斷：GH-IGF axis 有明確的基因突變 (即 homozygotes 或 compound heterozygotes) (請檢附檢驗報告)。</p> <p>(2)開始治療條件：</p> <p>I. <u>2歲以上</u>。</p> <p>II. ~VIII. (略)。</p> <p>3. Isolated growth hormone deficiency type IA (GHD-IA)</p> <p>(1)診斷：GH1 gene 有明確的脫失突變 (deletion) (請檢附檢驗報告)</p> <p>(2)開始治療條件：</p> <p>I. <u>2歲以上</u>。</p> <p>II. ~VI. (略)。</p>	<p>5. 5. 7. Mecasermin (如 Increlex 注射劑) (98/5/1)</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. Primary IGF-I deficiency</p> <p>(1)診斷：GH-IGF axis 有明確的基因突變 (即 homozygotes 或 compound heterozygotes) (請檢附檢驗報告)。</p> <p>(2)開始治療條件：</p> <p>I. <u>年齡至少二歲</u>。</p> <p>II. ~VIII. (略)。</p> <p>3. Isolated growth hormone deficiency type IA (GHD-IA)</p> <p>(1)診斷：GH1 gene 有明確的脫失突變 (deletion) (請檢附檢驗報告)</p> <p>(2)開始治療條件：</p> <p>I. <u>年齡至少二歲</u>。</p> <p>II. ~VI. (略)。</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>4. ~5. (略)。</p> <p>6. 繼續治療條件：</p> <p>(1)男童骨齡<u>未滿 16 歲</u>，女童骨齡<u>未滿 14 歲</u>，且骨端尚未癒合患者。</p> <p>(2)~(3) (略)。</p>	<p>4. ~5. (略)。</p> <p>6. 繼續治療條件：</p> <p>(1)男童骨齡<u><16 歲</u>，女童骨齡<u><14 歲</u>，且骨端尚未癒合患者。</p> <p>(2)~(3) (略)。</p>
<p>6. 2. 4. Montelukast sodium (如 Singulair Coated Tab、Singulair Chewable Tabs) : (90/7/1、107/2/1、111/2/1)</p> <p>1. 限用於<u>6 歲以上</u>「輕度至中度持續性支氣管哮喘」疾患。</p> <p>2. ~3. (略)。</p> <p>6. 2. 5. Montelukast sodium 4mg(如 Singulair Chewable Tab. 4mg、Singulair oral granules 4mg) : (92/1/1、100/7/1、107/2/1、111/2/1)</p> <p>須符合下列各項條件：</p> <p>1. 限用於「輕度至中度持續支氣管哮喘病患」。</p> <p>2. Chewable Tab. 4mg 限用於<u>2 歲以上未滿 6 歲</u>、oral granules 4mg 限用於<u>6 個月以上未滿 6 歲</u>。</p> <p>3. ~4. (略)。</p>	<p>6. 2. 4. Montelukast sodium (如 Singulair Coated Tab、Singulair Chewable Tabs) : (90/7/1、107/2/1)</p> <p>1. 限用於<u>六歲以上之小兒及成人</u>「輕度至中度持續性支氣管哮喘」疾患。</p> <p>2. ~3. (略)。</p> <p>6. 2. 5. Montelukast sodium 4mg(如 Singulair Chewable Tab. 4mg、Singulair oral granules 4mg) : (92/1/1、100/7/1、107/2/1)</p> <p>須符合下列各項條件：</p> <p>1. 限用於「輕度至中度持續支氣管哮喘病患」。</p> <p>2. Chewable Tab. 4mg 限用於<u>二歲~五歲嬰幼兒</u>、oral granules 4mg 限用於<u>6 個月~五歲嬰幼兒</u>。</p> <p>3. ~4. (略)。</p>
<p>6. 2. 6. Omalizumab (如 Xolair) : (97/6/1、100/6/1、103/10/1、111/2/1)</p> <p>1. 限用於</p> <p>(1)(略)。</p> <p>(2)<u>6 歲以上未滿 13 歲</u>兒童經胸腔內科或小兒科或過敏免疫專科醫師診斷為「重度持續性氣喘」病患，需符合下列條件。(100/6/1、111/2/1)</p> <p>I. ~IV. (略)。</p>	<p>6. 2. 6. Omalizumab (如 Xolair) : (97/6/1、100/6/1、103/10/1)</p> <p>1. 限用於</p> <p>(1)(略)。</p> <p>(2)<u>6 至 12 歲</u>兒童經胸腔內科或小兒科或過敏免疫專科醫師診斷為「重度持續性氣喘」病患，需符合下列條件。(100/6/1)</p> <p>I. ~IV. (略)。</p>
<p>8. 1. 3. 高單位免疫球蛋白：</p> <p>限符合下列適應症病患檢附病歷摘要 (註明診斷，相關檢查報告及數據，體</p>	<p>8. 1. 3. 高單位免疫球蛋白：</p> <p>限符合下列適應症病患檢附病歷摘要 (註明診斷，相關檢查報告及數據，體</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>重、年齡、性別、病史、曾否使用同一藥品及其療效…等)</p> <p>1. 靜脈注射劑：</p> <p>(1)~(2)(略)。</p> <p>(3)免疫血小板缺乏性紫斑症(ITP)且於懷孕或分娩期間，或急性免疫血小板缺乏性紫斑症(ITP) <u>18歲以下兒童</u>。 (107/4/1、108/6/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>(4)~(7)略。</p> <p>(8)急性發炎性去髓鞘多發性神經根病變(Guillain Barré症候群)：(107/12/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>I.~II.(略)。</p> <p>III. 使用於 <u>18歲以上</u>病人</p> <p>i.~ii.(略)。</p> <p>(9)(略)。</p> <p>2.(略)。</p>	<p>重、年齡、性別、病史、曾否使用同一藥品及其療效…等)</p> <p>1. 靜脈注射劑：</p> <p>(1)~(2)(略)。</p> <p>(3)免疫血小板缺乏性紫斑症(ITP)且於懷孕或分娩期間，或急性免疫血小板缺乏性紫斑症(ITP) <u>≤18歲兒童</u>。(107/4/1、108/6/1)</p> <p>(4)~(7)略。</p> <p>(8)急性發炎性去髓鞘多發性神經根病變(Guillain Barré症候群)：(107/12/1)</p> <p>I.~II.(略)。</p> <p>III. 使用於 <u>18歲(含)以上成人</u>病人</p> <p>i.~ii.(略)。</p> <p>(9)(略)。</p> <p>2.(略)。</p>
<p>8.2.4.1. Etanercept(如 Enbrel)； adalimumab(如 Humira)； tocilizumab(如 Actemra) (94/3/1、101/12/1、102/1/1、 102/10/1、105/10/1、108/1/1、 <u>111/2/1</u>)：兒童治療部分</p> <p>1. Etanercept 限使用於 <u>4歲以上</u>具有活動性多關節幼年型慢性關節炎患者。 adalimumab 限使用於 <u>2歲以上</u>具有活動性多關節幼年型慢性關節炎患者 (101/12/1、105/10/1、108/1/1)。 tocilizumab 限使用於 <u>2歲以上的</u>活動性多關節幼年型慢性關節炎患者。 (102/10/1)</p> <p>2.~7.(略)。</p>	<p>8.2.4.1. Etanercept(如 Enbrel)； adalimumab(如 Humira)； tocilizumab(如 Actemra) (94/3/1、101/12/1、102/1/1、 102/10/1、105/10/1、108/1/1)：兒童治療部分</p> <p>1. Etanercept 限使用於 <u>4歲(含)以上的</u>兒童具有活動性多關節幼年型慢性關節炎患者。adalimumab 限使用於 <u>2歲(含)以上</u>具有活動性多關節幼年型慢性關節炎患者(101/12/1、105/10/1、108/1/1)。tocilizumab 限使用於 <u>2歲(含)以上的</u>活動性多關節幼年型慢性關節炎患者。(102/10/1)</p> <p>2.~7.(略)。</p>
<p>8.2.4.7.2. Adalimumab(如 Humira)、 infliximab(如 Remicade) (105/10/1、106/5/1、108/10/1、 <u>111/2/1</u>)：兒童治療部分</p> <p>1.~2.(略)。</p>	<p>8.2.4.7.2. Adalimumab(如 Humira)、 infliximab(如 Remicade) (105/10/1、106/5/1、108/10/1)：兒童治療部分</p> <p>1.~2.(略)。</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>3. <u>6歲以上</u>，經診斷為小兒克隆氏症且領有重大傷病證明，並排除第6項之情形及符合下列條件之一；且申請時應附上影像診斷評估報告。</p> <p>(以下略)</p>	<p>3. <u>六歲(含)以上</u>，經診斷為小兒克隆氏症且領有重大傷病證明，並排除第6項之情形及符合下列條件之一；且申請時應附上影像診斷評估報告。</p> <p>(以下略)</p>
<p>8. 2. 4. 8. Abatacept 靜脈注射劑（如 Orencia IV）(101/10/1、102/1/1、104/8/1、108/1/1)：用於幼年型慢性關節炎治療部分</p> <p>1. 紿付條件：</p> <p>(1)限用於曾經接受抗腫瘤壞死因子拮抗劑(如 etanercept)治療，但未達療效或無法耐受之 <u>6歲以上</u>有幼年型慢性關節炎之患者。(108/1/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>(2)(略)。</p> <p>2. ~6. (略)。</p>	<p>8. 2. 4. 8. Abatacept 靜脈注射劑（如 Orencia IV）(101/10/1、102/1/1、104/8/1、108/1/1)：用於幼年型慢性關節炎治療部分</p> <p>1. 紉付條件：</p> <p>(1)限用於曾經接受抗腫瘤壞死因子拮抗劑(如 etanercept)治療，但未達療效或無法耐受之 <u>6歲(含)以上</u>有幼年型慢性關節炎之<u>兒童</u>患者。(108/1/1)</p> <p>(2)(略)。</p> <p>2. ~6. (略)。</p>
<p>8. 2. 4. 9. 2. Infliximab (如 Remicade) (107/8/1、108/10/1、<u>111/2/1</u>)：兒童治療部分</p> <p>1. 限具有消化系專科醫師證書之內科、兒科專科醫師處方使用。</p> <p>2. 須經事前審查核准後使用。</p> <p>3. <u>6歲以上</u>，經診斷為小兒潰瘍性結腸炎，並符合下列條件之一：</p> <p>(以下略)</p>	<p>8. 2. 4. 9. 2. Infliximab (如 Remicade) (107/8/1、108/10/1)：兒童治療部分</p> <p>1. 限具有消化系專科醫師證書之內科、兒科專科醫師處方使用。</p> <p>2. 須經事前審查核准後使用。</p> <p>3. <u>六歲(含)以上</u>，經診斷為小兒潰瘍性結腸炎，並符合下列條件之一：</p> <p>(以下略)</p>
<p>8. 2. 6. 1. Interferon alpha-2a (如 Roferon-A) 及 interferon alpha-2b (如 Intron A) (92/10/1、109/7/1)； peginterferon alfa-2a (如 Pegasys) (92/11/1-C 肝、94/11/1-B 肝、96/10/1、98/11/1、99/5/1-B 肝、100/6/1-B 肝、102/2/1、105/10/1、106/1/1、106/4/1、109/7/1、110/3/1、<u>111/2/1</u>)：</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. (1)~(5)(略)。</p>	<p>8. 2. 6. 1. Interferon alpha-2a (如 Roferon-A) 及 interferon alpha-2b (如 Intron A) (92/10/1、109/7/1)； peginterferon alfa-2a (如 Pegasys) (92/11/1-C 肝、94/11/1-B 肝、96/10/1、98/11/1、99/5/1-B 肝、100/6/1-B 肝、102/2/1、105/10/1、106/1/1、106/4/1、109/7/1)：</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. (1)~(5)(略)。</p> <p>(6) 小於七十歲以下，罹患中、晚期之低</p>

修訂後給付規定	原給付規定
(6) <u>70 歲以下</u> ，罹患中、晚期之 <u>低度非何杰金氏淋巴瘤</u> (low grade non-Hodgkin' s lymphoma)，且具有 <u>高腫瘤負荷</u> (high tumor burden)之病患。 (89/1/1) (7)~(9)(略)。	度非何杰金氏淋巴瘤(low grade non-Hodgkin' s lymphoma)，且具有高腫瘤負荷(high tumor burden)之病患。 (89/1/1) (7)~(9)(略)。
8. 2. 8. Palivizumab (如 Synagis)(99/12/1、102/7/1、106/4/1、111/2/1) 限符合下列條件之一： 1. 出生時懷孕週數 <u>未滿 31 週</u> 之早產兒。 (106/4/1) 2. 併有慢性肺疾病(Chronic Lung Disease；CLD)之早產兒(<u>35 週以下</u>)。 3. <u>1 歲以下</u> 患有 <u>血液動力學上顯著異常</u> 之先天性心臟病童。需符合以下條件： (以下略)	8. 2. 8. Palivizumab (如 Synagis)(99/12/1、102/7/1、106/4/1) 限符合下列條件之一： 1. 出生時懷孕週數小於或等於 30 週之早產兒。(106/4/1) 2. 併有慢性肺疾病(Chronic Lung Disease；CLD)之早產兒(小於或等於 35 週)。 3. <u>一歲以下</u> 患有 <u>血液動力學上顯著異常</u> 之先天性心臟病童。需符合以下條件： (以下略)
9. 24. Gefitinib(如 Iressa):(93/11/1、96/8/1、96/11/1、100/6/1、101/5/1、101/10/1、103/5/1、106/11/1 108/6/1、108/11/1、109/4/1、109/6/1、109/10/1) 1. 限單獨使用於 (1)(略)。 (2)先前已使用過第一線含鉑化學治療，或 <u>70 歲以上</u> 接受過第一線化學治療，但仍局部惡化或轉移之肺腺癌。 (96/11/1、100/6/1、111/2/1) 2. (略)。	9. 24. Gefitinib(如 Iressa):(93/11/1、96/8/1、96/11/1、100/6/1、101/5/1、101/10/1、103/5/1、106/11/1 108/6/1、108/11/1、109/4/1、109/6/1、109/10/1) 1. 限單獨使用於 (1)(略)。 (2)先前已使用過第一線含鉑化學治療，或 <u>70 歲(含)以上</u> 接受過第一線化學治療，但仍局部惡化或轉移之肺腺癌。 (96/11/1、100/6/1) 2. (略)。
9. 26. Pemetrexed(如 Alimta)： (95/3/1、95/7/1、97/11/1、98/9/1、103/4/1、103/9/1、106/11/1) 1. 限用於 (1)(略)。	9. 26. Pemetrexed(如 Alimta)： (95/3/1、95/7/1、97/11/1、98/9/1、103/4/1、103/9/1、106/11/1) 1. 限用於 (1)(略)。

修訂後給付規定	原給付規定
(2)以含鉑之化學療法治療或 <u>70歲以上</u> 接受過第一線化學治療，但仍失敗之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌病患（顯著鱗狀細胞組織型除外）之單一藥物治療。(95/7/1、97/11/1、98/9/1、 <u>111/2/1</u>) (以下略)	(2)以含鉑之化學療法治療或 <u>70歲(含)</u> 以上接受過第一線化學治療，但仍失敗之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌病患（顯著鱗狀細胞組織型除外）之單一藥物治療。(95/7/1、97/11/1、98/9/1) (以下略)
9. 27. Cetuximab (如 Erbitux)： (96/3/1、98/7/1、98/8/1、99/10/1、101/12/1、104/11/1、106/1/1、106/4/1、107/6/1、110/6/1) 1. (略)。 2. 口咽癌、下咽癌及喉癌治療部分： (98/7/1、99/10/1、 <u>111/2/1</u>) (1)限與放射線療法合併使用於局部晚期之口咽癌、下咽癌及喉癌患者，且符合下列條件之一： I. <u>70歲以上</u> ； (以下略)	9. 27. Cetuximab (如 Erbitux)： (96/3/1、98/7/1、98/8/1、99/10/1、101/12/1、104/11/1、106/1/1、106/4/1、107/6/1、110/6/1) 1. (略)。 2. 口咽癌、下咽癌及喉癌治療部分： (98/7/1、99/10/1) (1)限與放射線療法合併使用於局部晚期之口咽癌、下咽癌及喉癌患者，且符合下列條件之一： I. <u>年齡≥70歲</u> ； (以下略)
9. 29. Erlotinib (如 Tarceva)： (96/6/1、96/8/1、97/6/1、101/5/1、101/10/1、102/4/1、102/11/1、103/5/1、106/11/1、108/6/1、108/11/1、109/4/1、109/6/1、109/10/1、 <u>111/2/1</u>) 1. 限單獨使用於 (1)~(2)(略)。 (3)先前已使用過platinum類第一線化學治療，或 <u>70歲以上</u> 接受過第一線化學治療，但仍局部惡化或轉移之腺性非小細胞肺癌之第二線用藥。(97/6/1) (以下略)	9. 29. Erlotinib (如 Tarceva)： (96/6/1、96/8/1、97/6/1、101/5/1、101/10/1、102/4/1、102/11/1、103/5/1、106/11/1、108/6/1、108/11/1、109/4/1、109/6/1、109/10/1) 1. 限單獨使用於 (1)~(2)(略)。 (3)先前已使用過platinum類第一線化學治療，或 <u>70歲(含)以上</u> 接受過第一線化學治療，但仍局部惡化或轉移之腺性非小細胞肺癌之第二線用藥。 (97/6/1) (以下略)
9. 36. 2. Everolimus 2.5mg 及 5mg(如 Votubia)：(102/1/1、106/4/1)	9. 36. 2. Everolimus 2.5mg 及 5mg(如 Votubia)：(102/1/1、106/4/1)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>1. (略)。</p> <p>2. 結節性硬化症併有腎血管肌脂肪瘤之成年病患，且需符合以下條件(106/4/1、<u>111/2/1</u>)：</p> <p>(1)限 <u>18 歲以上</u>病人，其腎血管肌脂肪瘤最長直徑已達 4cm(含)以上且仍有持續進展之證據，且曾有發生臨床上有意義之出血或確認病灶有血管瘤(aneurysm)直徑≥5mm 者，病灶不只一處，且經腎臟或泌尿專科醫師評估無法以外科手術或動脈栓塞治療，或經動脈栓塞治療或外科手術後無效或復發者。</p> <p>(2)~(4)(略)。</p>	<p>1. (略)。</p> <p>2. 結節性硬化症併有腎血管肌脂肪瘤之成年病患，且需符合以下條件(106/4/1)：</p> <p>(1)限 <u>18(含)歲以上</u>病人，其腎血管肌脂肪瘤最長直徑已達 4cm(含)以上且仍有持續進展之證據，且曾有發生臨床上有意義之出血或確認病灶有血管瘤(aneurysm)直徑≥5mm 者，病灶不只一處，且經腎臟或泌尿專科醫師評估無法以外科手術或動脈栓塞治療，或經動脈栓塞治療或外科手術後無效或復發者。</p> <p>(2)~(4)(略)。</p>
<p>10. 6. 1. 3. Fluconazole 口服液劑 (如 Fluzole powder for oral suspension)：(108/12/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>1. 限用於 <u>12 歲以下</u>或吞嚥困難患者，併下列條件之一使用： 念珠球菌局部或全身感染、囊珠菌感染。 (以下略)</p>	<p>10. 6. 1. 3. Fluconazole 口服液劑 (如 Fluzole powder for oral suspension)：(108/12/1)</p> <p>1. 限用於 <u>12 歲(含)以下</u>兒童或吞嚥困難患者，併下列條件之一使用： 念珠球菌局部或全身感染、囊珠菌感染。 (以下略)</p>
<p>10. 6. 7. Micafungin Injection 劑型 (如 Mycamine for Injection)： (96/4/1、97/10/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>限用於</p> <p>1. 治療 16 歲以上的食道念珠菌感染。</p> <p>2. ~3. (略)。</p>	<p>10. 6. 7. Micafungin Injection 劑型 (如 Mycamine for Injection)：(96/4/1) (97/10/1)</p> <p>限用於</p> <p>1. 治療 16 歲以上<u>成人的</u>食道念珠菌感染。</p> <p>2. ~3. (略)。</p>
<p>10. 6. 10. Posaconazole (如 Posanol)： (101/1/1、104/7/1、106/5/1)</p> <p>1. 限下列條件之一使用：</p> <p>(1)~(3)(略)。</p> <p>(4) 急性骨髓性白血病 (acute myelogenous leukemia) 或高危險骨髓化生不良症候群 (myelodysplastic syndrome) 病人接受誘導性化學治療</p>	<p>10. 6. 10. Posaconazole (如 Posanol)： (101/1/1、104/7/1、106/5/1)</p> <p>1. 限下列條件之一使用：</p> <p>(1)~(3)(略)。</p> <p>(4) 急性骨髓性白血病 (acute myelogenous leukemia) 或高危險骨髓化生不良症候群 (myelodysplastic syndrome) 病人接受誘導性化學治療</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>者,給付條件如下:(104/7/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>I .(略)。</p> <p>II . 誘導性化學治療需使用「cytarabine(Ara-C)7天及anthracycline類藥物3天」、或「高劑量Ara-C」、或「老年人(<u>60歲以上</u>)使用cytarabine(Ara-C)5天及anthracycline類藥物2天」、或較上述療法更強的化學治療。</p> <p>(以下略)</p>	<p>者,給付條件如下:(104/7/1)</p> <p>I .(略)。</p> <p>II . 誘導性化學治療需使用「cytarabine(Ara-C)7天及anthracycline類藥物3天」、或「高劑量Ara-C」、或「老年人(<u>>60歲</u>)使用cytarabine(Ara-C)5天及anthracycline類藥物2天」、或較上述療法更強的化學治療。</p> <p>(以下略)</p>
<p>10.7.8. Sofosbuvir/ledipasvir (如Harvoni) (107/1/1、107/6/1、107/10/1、108/1/1、108/6/1、109/1/1、109/7/1、110/6/1、<u>111/2/1</u>)：</p> <p>1.(略)。</p> <p>2. 限使用於HCV RNA為陽性之下列病患：(107/6/1、107/10/1、108/1/1、108/6/1)</p> <p>(1)(略)。</p> <p>(2)<u>12歲以上且未併有失代償性肝硬化之病毒基因型第1型兒童患者</u>。</p>	<p>10.7.8. Sofosbuvir/ledipasvir (如Harvoni) (107/1/1、107/6/1、107/10/1、108/1/1、108/6/1、109/1/1、109/7/1、110/6/1)：</p> <p>1.(略)。</p> <p>2. 限使用於HCV RNA為陽性之下列病患：(107/6/1、107/10/1、108/1/1、108/6/1)</p> <p>(1)(略)。</p> <p>(2)<u>12歲(含)以上且未併有失代償性肝硬化之病毒基因型第1型兒童患者</u>。</p>
<p>10.7.10. Glecaprevir/pibrentasvir (如Maviret) (107/8/1、108/1/1、108/6/1、109/1/1、109/4/1、109/7/1、109/8/1、110/6/1)：</p> <p>1.(略)。</p> <p>2. 限使用於HCV RNA為陽性及無肝功能代償不全之病毒基因型第1型、第2型、第3型、第4型、第5型或第6型<u>12歲以上</u>病患。(108/1/1、108/6/1、109/8/1、<u>111/2/1</u>)</p>	<p>10.7.10. Glecaprevir/pibrentasvir (如Maviret) (107/8/1、108/1/1、108/6/1、109/1/1、109/4/1、109/7/1、109/8/1、110/6/1)：</p> <p>1.(略)。</p> <p>2. 限使用於HCV RNA為陽性及無肝功能代償不全之病毒基因型第1型、第2型、第3型、第4型、第5型或第6型<u>12歲(含)以上</u>病患。(108/1/1、108/6/1、109/8/1)</p>
(本項刪除)	<p>10.8.4. Telithromycin (如Ketek)：(93/10/1)</p> <p>限用於成人(18歲以上)之慢性支氣管炎的急性惡化或輕度至中度社區性肺炎。</p>
13.10. Tacrolimus (如Protopic)	13.10. Tacrolimus (如Protopic)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>Ointment) : (91/12/1、93/8/1、95/7/1、99/12/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>限<u>2歲以上</u>因為潛在危險而不宜使用其他傳統治療、或對其他傳統治療反應不充分、或無法耐受其他傳統治療且患部面積>30%之中、重度異位性皮膚炎之下列病患第二線使用：</p> <p>(以下略)</p>	<p>Ointment) : (91/12/1、93/8/1、95/7/1、99/12/1)</p> <p>限<u>二歲以上孩童、青少年及成人</u>因為潛在危險而不宜使用其他傳統治療、或對其他傳統治療反應不充分、或無法耐受其他傳統治療且患部面積>30%之中、重度異位性皮膚炎之下列病患第二線使用：</p> <p>(以下略)</p>
<p>13.11. Pimecrolimus (Elidel 1%) : (92/11/1、93/8/1、94/3/1、95/7/1、99/12/1、110/12/1、<u>111/2/1</u>)</p> <p>限<u>2歲以上</u>且患部面積>30%之中、重度異位性皮膚炎，或敏感性皮膚部位(頭頸部、眼瞼、耳後區、生殖器、皮膚彎曲處、腋下、鼠蹊部)異位性皮膚炎之下列病患第二線使用：(94/3/1、95/7/1、110/12/1)</p> <p>(以下略)</p>	<p>13.11. Pimecrolimus (Elidel 1%) : (92/11/1、93/8/1、94/3/1、95/7/1、99/12/1)</p> <p>限<u>二歲以上孩童、青少年及成人</u>且患部面積>30%之中、重度異位性皮膚炎之下列病患第二線使用：(94/3/1、95/7/1)</p>

備註：劃線部分為新修訂規定

*統一用阿拉伯數字

*統一用「以上、以下、未滿」等法定文字，不使用符號

*拿掉「年齡」贅字

*以仿單適應症為主

*如有疑慮的品項，在適應症一欄備註：「備註：因給付規定與仿單適應症不相符，故需確認是否一併修正」。