

- 1.1.5. 非類固醇抗發炎劑 (NSAIDs) 藥品，屬下列成分之口服製劑：  
celecoxib、nabumetone、meloxicam、etodolac、nimesulide  
(90/7/1、97/9/1)、etoricoxib (96/1/1、99/10/1)、含 naproxen 及  
esomeprazole 複方製劑(101/10/1、106/12/1、111/2/1、111/7/1)
1. 本類製劑之使用需符合下列條件之一者(99/10/1、111/7/1)：
- (1) 骨關節炎病患。(106/12/1、111/2/1、111/7/1)
- I. 每日藥費為4.5元以下，可用於18歲以上病患。
- II. 依個別成分規定如下：
- i 含 celecoxib 成分之 Relecox 200mg 僅可使用於50歲以上病患。
- ii 含 nabumetone 成分之 No-Ton、Nabuton、Labuton 及含  
etoricoxib 之 Arcoxia 60mg 僅可使用於60歲以上病患。
- iii 含 etodolac 成分之緩釋錠劑膠囊劑及一般錠劑膠囊劑僅可使用於  
60歲以上病患，惟單價低於2.25元(如 Etopin、Etodon、Jenac、  
Doloc)且每日處方不超過2粒者，可用於18歲以上之病患。
- (2) 類風濕性關節炎、僵直性脊髓炎、乾癬性關節炎等慢性病發炎性關節病變，需長期使用非類固醇抗發炎劑者。
- (3) 合併有急性嚴重創傷、急性中風及急性心血管事件者 (97/2/1)
- (4) 同時併有腎上腺類固醇之患者。
- (5) 曾有消化性潰瘍、上消化道出血或胃穿孔病史者。
- (6) 同時併有抗凝血劑者。
- (7) 肝硬化患者。
2. 使用本類製劑之病患不得預防性併用乙型組織胺受體阻斷劑、氫離子幫浦阻斷劑及其他消化性潰瘍用藥，亦不得合併使用前列腺素劑 (如 misoprostol)
3. Nimesulide 限用於急性疼痛緩解，其連續處方不得超過15日 (97/9/1)。
4. 含 naproxen 及 esomeprazole 複方製劑不得作為急性疼痛的初始治療。(101/10/1)