

- 1.2.2.2. Second generation antipsychotics(簡稱第二代抗精神病藥品，如 clozapine、olanzapine、risperidone、quetiapine、amisulpride、ziprasidone、aripiprazole、paliperidone、lurasidone、brexpiprazole 等)：(91/9/1、92/1/1、92/7/1、94/1/1、95/10/1、97/5/1、99/10/1、106/1/1、109/1/1、109/6/1、112/7/1)
1. 本類製劑之使用需符合下列條件(95/10/1、97/5/1、99/10/1、106/1/1、109/1/1、112/7/1)：
 - (1) 開始使用「第二代抗精神病藥品」時需於病歷記載：醫療理由或診斷。(112/7/1)。
 - (2) 日劑量超過下列治療劑量時，需於病歷記載理由：
 - clozapine 400 mg/day
 - risperidone 6 mg/day
 - olanzapine 20 mg/day
 - quetiapine 600 mg/day
 - amisulpride 800mg/day (92/1/1)
 - ziprasidone 120mg/day (92/7/1)
 - aripiprazole 15mg/day (94/1/1)
 - paliperidone 12mg/day (97/5/1)
 - lurasidone 120mg/day (106/1/1)
 - brexpiprazole 4mg/day (109/1/1)
 2. 本類藥品除 quetiapine 緩釋劑型及 lurasidone 外，不得使用於雙極性疾患之鬱症發作。(95/10/1、109/6/1)
 3. Olanzapine 用於預防雙極性疾患復發時，限 lithium、carbamazepine、valproate 等藥品至少使用兩種以上，治療無效或無法耐受副作用時使用。(95/10/1)