

1. 3. 4. 帕金森氏症治療藥品：(91/11/1、93/2/1、95/9/1、96/9/1、97/7/1、100/6/1、101/6/1、108/10/1、110/11/1、111/3/1)
 1. 如病人開始出現功能障礙，在使用 levodopa 之前或同時，得使用一種 dopamine agonist (ropinirole、pramipexole、pergolide、lisuride 及 rotigotine)，或 amantadine，或是 levodopa 併用 COMT 抑制劑 (entacapone：如 Comtan film-coated tab.；opicapone：如 Ongentys hard capsules)。(110/11/1)
 2. Levodopa+carbidopa+entacapone 三合一製劑（如 Stalevo）：限用於表現藥效終期運動功能波動現象，以左多巴/多巴脫羧基酶抑制劑無法達到穩定治療效果之巴金森氏症病人。(95/9/1)
 3. 緩釋型 levodopa + carbidopa （如 Numient）：(110/11/1)
 - (1)限使用於病人表現藥效終期運動功能波動現象，並使用 Levodopa + carbidopa+entacapone 三合一製劑或其他 levodopa 製劑合併 COMT 抑制劑後無效者，或是目前無其他積極治療的病人。
 - (2)每日至多可使用4粒。
 4. 若已同時使用上述藥物且達高劑量，仍無法達到滿意的 "on" state，或出現運動併發症（如異動症或肌強直），需合併使用多類藥物治療時，應於病歷上詳細記載理由。
 5. Rasagiline：(101/6/1、108/10/1)
 - (1)可單獨使用，每日最高劑量為1 mg。
 - (2)與 levodopa 或是其他抗帕金森藥物併用，rasagiline 每日最高劑量為0.5 mg。
 6. Pramipexole 及 ropinirole 用於治療原發性腿部躁動症時需先排除腎衰竭、鐵缺乏症及多發性神經病變，且不得與 dopamine agonist 及 levodopa 併用。(96/9/1、97/7/1)
 - (1)pramipexole 每日最大劑量為0.75mg。(96/9/1)
 - (2)ropinirole 每日最大劑量為4mg。(97/7/1)
 7. Rotigotine 貼片劑（如 Neupro Patch），限用於原發性帕金森氏症，每日限用一片，且不得併用其他 dopamine agonist 之口服藥品(100/6/1)
 8. Safinamide(如 Equufina)：(111/3/1)
 - (1)與 levodopa 併用，用於在使用含有 levodopa 製劑情況下出現運動功能波動現象之病患。
 - (2)每日限使用1錠。若每日需使用2錠，應於病歷上詳細記載理由。