

10.8.3. Linezolid(如 Zyvox Injection 及 Tablets):(91/4/1、100/7/1、105/2/1、108/4/1)

1. 限下列條件之一使用：

- (1)確定或高度懷疑為 MRSA 肺炎（痰液培養出 MRSA，伴隨全身發炎反應，且 CXR 出現新的浸潤或痰液性狀改變或氧氣需求增加），並符合下列危險因子之一：(105/2/1、108/4/1)
- I . 65 歲以上。
  - II . BMI $\geq$ 30。
  - III . 急性腎衰竭、腎功能不穩定時。
  - IV . 過去 90 天內曾使用 glycopeptides 者。(108/4/1)
- (2)因嚴重肺炎致呼吸衰竭或合併嚴重敗血症之患者，同時有其他部位懷疑或證實為 MRSA 感染，得以經驗性使用；惟後續呼吸道微生物學檢查結果無 MRSA 呼吸道感染證據時，應停止使用。(108/4/1)
- (3)證實為 MRSA 複雜性皮膚和皮膚構造感染，並符合下列條件之一：(108/4/1)
- I . 有全身性感染徵兆且白血球數異常 ( $>12,000$  或  $<4,000$  cells/ $\text{mcL}$ )。
  - II . 免疫功能不全。
- (4)證實為 VRE (vancomycin-resistant enterococci) 感染，且其 VRE 菌株對 ampicillin 為抗藥者。(108/4/1)
- (5)其他抗藥性革蘭氏陽性球菌感染，因病情需要，經感染症專科醫師會診確認需要使用者。
2. 心內膜炎 (endocarditis) 病患不建議使用。(108/4/1)
3. 申報費用時需檢附會診紀錄或相關之病歷資料。