

5.1.3.2. Liraglutide (如 Victoza)、dulaglutide (如 Trulicity)、
lixisenatide(如 Lyxumia)、semaglutide (如 Ozempic) (101/10/1、
105/5/1、105/8/1、107/4/1、107/7/1、109/5/1、109/8/1、109/9/1、
109/12/1)

1. 限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin 及/或 sulfonylurea 類藥物，
且併用下列藥品之一持續6個月之後，HbA1c 仍高於8.5%以上之第二型糖
尿病患者：(109/5/1)
 - (1)SGLT-2抑制劑
 - (2)DPP-4抑制劑
 - (3)SGLT-2抑制劑合併 DPP-4抑制劑複方藥品
 - (4)Insulin
2. 當患者已接受前述口服降血糖藥物，及/或基礎胰島素治療仍未達理想血
糖控制時，與口服降血糖藥物及/或基礎胰島素併用。
3. 發生重大心血管事件，如心肌梗塞、接受冠狀動脈或其他動脈血管再通
術(revascularization)、動脈硬化相關之缺血性腦中風等之病人，於接
受過最大耐受劑量的 metformin 後，仍無法理想控制血糖之第二型糖尿
病患者，可考慮不須使用其他口服降血糖藥品而考慮使用 liraglutide
或 dulaglutide 或 semaglutide。(109/12/1)
4. 本藥品不得與 DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑併用。
5. 109年5月1日前已依生效前之給付規定使用本類藥物之病人，得繼續使用
原藥物至醫師更新其處方內容 (109/8/1)。